

**สรุปสถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๔**

โรคเฝ้าระวังที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับ

อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ อูจจาระร่วง ปอดอักเสบ อาหารเป็นพิษ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้หวัดใหญ่ สุกใส ตาแดง กามโรคทุกชนิด มือเท้าปาก และ ไข้เลือดออกทุกชนิด ตามลำดับ

(ข้อมูลจาก รง.๕๐๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)


ลำดับ	โรค	รวมป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	รวมตาย (ราย)	อัตรารัตาย ต่อแสน	มัธยฐานอัตราป่วย(๕๙-๖๓) ช่วงเวลาเดียวกัน
๑	อูจจาระร่วง	๓,๘๔๕	๔๖๘.๘๕	๐	๐.๐๐	๗๗๑.๙๐
๒	ปอดอักเสบ	๓๓๐	๔๐.๒๔	๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๒
๓	อาหารเป็นพิษ	๓๒๓	๓๙.๓๙	๐	๐.๐๐	๒๒๐.๑๙
๔	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	๒๖๔	๓๒.๑๙	๐	๐.๐๐	๑๕๕.๒๑
๕	ไข้หวัดใหญ่	๗๔	๙.๐๒	๐	๐.๐๐	๑๐๐.๔๖
๖	สุกใส	๗๔	๙.๐๒	๐	๐.๐๐	๔๑.๙๕
๗	ตาแดง	๗๓	๘.๙๐	๐	๐.๐๐	๔๒.๕๖
๘	กามโรคทุกชนิด	๗๑	๘.๖๖	๐	๐.๐๐	๑๔.๒๗
๙	มือเท้าปาก	๓๖	๔.๓๙	๐	๐.๐๐	๑๙.๖๓
๑๐	ไข้เลือดออกทุกชนิด	๒๘	๓.๔๑	๐	๐.๐๐	๑๖.๒๒

สถานการณ์โรคอูจจาระร่วง

ตารางที่ ๒ สถานการณ์โรคอูจจาระร่วงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔

(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับ เขต ๔ (อัตราป่วย)	ลำดับ ประเทศ (อัตราป่วย)	จังหวัด	รวมป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	รวมตาย (ราย)	อัตรารัตาย ต่อแสน
๑	๑๒	พระนครศรีอยุธยา	๓,๘๔๕	๔๖๘.๘๕	๐	๐.๐๐
๒	๒๓	นครนายก	๙๔๙	๓๖๔.๔๑	๐	๐.๐๐
๓	๓๑	สระบุรี	๒,๒๕๖	๓๔๙.๕๑	๐	๐.๐๐
๔	๓๖	อ่างทอง	๘๙๕	๓๑๙.๓๖	๐	๐.๐๐
๕	๕๖	สิงห์บุรี	๕๑๒	๒๔๕.๐๘	๐	๐.๐๐
๖	๖๐	ลพบุรี	๑,๖๑๗	๒๑๓.๕๗	๐	๐.๐๐
๗	๖๔	นนทบุรี	๒,๒๕๒	๑๗๙.๓๒	๐	๐.๐๐
๘	๗๕	ปทุมธานี	๗๒๔	๖๒.๖๙	๐	๐.๐๐
		รวมเขต ๔	๑๓,๐๕๐	๒๔๒.๔๙	๐	๐.๐๐
		รวมทั้งประเทศ	๒๐๖,๖๒๒	๓๑๐.๗๗	๐	๐.๐๐



รูปที่ ๑ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอุจจาระร่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เทียบระดับประเทศ (ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)


สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง

(ข้อมูลจาก รง.๕๐๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา)

นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๔๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๖๘.๘๕ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง ๒๓๔๑ ราย เพศชาย ๑๕๐๔ ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ ๑.๕๖ : ๑

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐-๔ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๑๑๗๗.๐๗ รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๒๐-๒๔, ๒๕-๒๙, ๓๐-๓๔, ๑๕-๑๙, ๖๐ ขึ้นไป, ๓๕-๓๙, ๔๐-๔๔, ๑๐-๑๔, ๕๕-๕๙, ๔๕-๔๙, ๕๐-๕๔ อัตราป่วยเท่ากับ ๘๔๔.๙๒, ๗๖๗.๔๘, ๕๓๐.๕๓, ๕๑๒.๙๒, ๓๘๗.๗๓, ๓๖๑.๔๓, ๓๕๖.๐๑, ๓๒๑.๒๗, ๓๑๔.๕๘, ๒๗๒.๒ และ ๒๓๙.๗ ตามลำดับ




รูปที่ ๒ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔

เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงต่ำกว่าค่ามัธยฐานในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยในมกราคม ๗๒๔ ราย กุมภาพันธ์ ๑๐๑๙ ราย มีนาคม ๑๒๓๐ ราย เมษายน ๘๗๒ ราย ดังรูป




รูปที่ ๓ จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายเดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง



รูปที่ ๔ จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบมัธยฐานรายสัปดาห์

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ ๑๓๓๖ ราย โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ ๔๒๕ ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ ๑๑๗๗ ราย คลินิกราชการ เท่ากับ ๑ ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่ากับ ๙๐๖ ราย

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอบางซ้าย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๗๐.๔๙ (๒๐๗ ราย) รองลงมาคือ บางปะหัน ๗๗๖.๔๕ (๓๒๕ ราย), บางไทร ๗๕๙.๘๒ (๓๖๖ ราย), ลาดบัวหลวง ๖๘๘.๐๗ (๒๗๓ ราย), อุทัย ๕๕๖.๒๗ (๒๙๓ ราย), ผักไห้ ๕๕๓.๒๑ (๒๒๔ ราย), บางบาล ๔๖๒.๑๔ (๑๕๘ ราย), พระนครศรีอยุธยา ๔๕๘.๘๗ (๑๘๗ ราย), เสนา ๔๓๗.๖ (๒๙๑ ราย), นครหลวง ๔๒๖.๘๘ (๑๕๗ ราย), ท่าเรือ ๓๘๐.๙๓ (๑๗๘ ราย), บ้านแพรก ๓๓๔.๑๑ (๓๐ ราย), วังน้อย ๓๒๑.๕๔ (๒๔๔ ราย), ภาชี ๓๐๕.๐๕ (๙๕ ราย), บางปะอิน ๒๗๙.๕๖ (๓๑๗ ราย) และ มหาราช ๑๗๑.๖ (๔๐ ราย) ตามลำดับ




รูปที่ ๕ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายเดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง

สถานการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่

ตารางที่ ๓ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔
(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับ เขต ๔ (อัตราป่วย)	ลำดับ ประเทศ (อัตราป่วย)	จังหวัด	รวมป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	รวมตาย (ราย)	อัตราราย ต่อแสน
๑	๑๔	สระบุรี	๑๐๖	๑๖.๔๒	๐	๐.๐๐
๒	๓๖	สิงห์บุรี	๑๕	๗.๑๘	๐	๐.๐๐
๓	๔๐	พระนครศรีอยุธยา	๕๕	๖.๗๒	๐	๐.๐๐
๔	๔๖	อ่างทอง	๑๕	๕.๓๕	๐	๐.๐๐
๕	๕๘	ลพบุรี	๒๐	๒.๖๔	๐	๐.๐๐
๖	๖๓	นนทบุรี	๒๕	๑.๙๙	๐	๐.๐๐
๗	๗๔	นครนายก	๒	๐.๗๗	๐	๐.๐๐
๘	๗๕	ปทุมธานี	๖	๐.๕๒	๐	๐.๐๐
		รวมเขต ๔	๒๔๔	๔.๕๓	๐	๐.๐๐
		รวมทั้งประเทศ	๖,๒๕๓	๙.๔๐	๐	๐.๐๐



รูปที่ ๖ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เทียบระดับประเทศ
(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

(ข้อมูลจาก รง.๕๐๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา)

นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Influenza จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙.๐๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

พบผู้ป่วยเพศชายเท่ากับเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๓๗ ราย เพศหญิง ๓๗ ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ ๑ : ๑

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐-๔ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๕๘.๔๗ รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕-๙, ๖๐ ปีขึ้นไป, ๒๕-๒๙, ๑๕-๑๙, ๒๐-๒๔, ๕๐-๕๔, ๔๐-๔๔, ๑๐-๑๔, ๓๕-๓๙, ๔๕-๔๙, ๓๐-๓๔, ๕๕-๕๙ อัตราป่วยเท่ากับ ๒๔.๐๔, ๙.๒, ๘.๘๘, ๘.๔๔, ๕.๕๘, ๔.๕๒, ๔.๔๗, ๔.๒, ๓.๑, ๓.๐๙, ๑.๘ และ ๑.๖๗ ตามลำดับ




รูปที่ ๗ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔

เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม ๒๓ ราย กุมภาพันธ์ ๑๖ ราย มีนาคม ๑๙ ราย เมษายน ๑๖ ราย ดังรูป




รูปที่ ๘ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายเดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบ ค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ ๒๒ ราย โรงพยาบาลทั่วไปเท่ากับ ๕ ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ ๔๕ ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่ากับ ๒ ราย



รูปที่ ๙ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบ มัธยฐานรายสัปดาห์

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอมหาสาร อัตราป่วยเท่ากับ ๕๕.๗๗ (๑๓ ราย) รองลงมาคือ บางปะหัน ๔๕.๓๙ (๑๙ ราย), อุทัย ๑๑.๓๙ (๖ ราย), ท่าเรือ ๑๐.๗ (๕ ราย)บางไทร ๑๐.๓๘ (๕ ราย)บางปะอิน ๙.๗ (๑๑ ราย), บางบาล ๘.๗๗ (๓ ราย), วังน้อย ๖.๕๙ (๕ ราย)นครหลวง ๕.๔๔ (๒ ราย)เสนา ๓.๐๑ (๒ ราย), ลาดบัวหลวง ๒.๕๒ (๑ ราย), ผักไห้ ๒.๔๗ (๑ ราย)พระนครศรีอยุธยา ๐.๗๑ (๑ ราย)ภาชี ๐ (๐ ราย), บางซ้าย ๐ (๐ ราย), ๐ (๐ ราย), บ้านแพรก ๐ (๐ ราย)



รูปที่ ๑๐ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายอำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๖๔ เทียบค่ามัธยฐานอัตราป่วย ๕ ปี ย้อนหลัง

ข้อเสนอแนะ

โรคไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดได้ตลอดปีโดยมีผู้ป่วยมากซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงกลางปีฤดูฝนต่อไปถึงฤดูหนาวทุกคนควรเอาใจใส่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงหากเป็นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ เป็นต้น ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ (มีไข้มากกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส ร่วมกับไอ เจ็บคอ อาจมีอาการอื่นๆ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดเมื่อย อาเจียน ท้องเสีย) แต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๒ วัน ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา



การดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในคน ควรมีการประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ หากพบการระบาดต้องรีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทันทีและให้รับแจ้งทีม SRRT ระดับอำเภอสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่โดยเร็วการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยเน้นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช่น โรงเรียน ค่ายทหาร สถานประกอบการ รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากตามเอกสารคำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ

ตารางที่ ๔ สถานการณ์โรคปอดอักเสบในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔

(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับ เขต ๔ (อัตราป่วย)	ลำดับ ประเทศ (อัตราป่วย)	จังหวัด	รวมป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	รวมตาย (ราย)	อัตราราย ต่อแสน
๑	๕๑	สิงห์บุรี	๑๐๗	๕๑.๒๒	๐	๐.๐๐
๒	๕๔	สระบุรี	๓๐๗	๔๗.๕๖	๐	๐.๐๐
๓	๖๒	ลพบุรี	๒๙๑	๓๘.๔๓	๐	๐.๐๐
๔	๖๓	อ่างทอง	๑๐๗	๓๘.๑๘	๐	๐.๐๐
๕	๖๖	พระนครศรีอยุธยา	๒๕๔	๓๑.๐๒	๐	๐.๐๐
๖	๗๐	นนทบุรี	๓๐๕	๒๔.๒๙	๐	๐.๐๐
๗	๗๑	นครนายก	๖๑	๒๓.๔๒	๐	๐.๐๐
๘	๗๕	ปทุมธานี	๑๙๖	๑๖.๙๗	๒	๐.๑๗
		รวมเขต ๔	๑,๖๒๘	๓๐.๒๕	๒	๐.๐๔
		รวมทั้งประเทศ	๕๐,๒๙๕	๗๕.๖๕	๕๑	๐.๐๘



รูปที่ ๑๑ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคปอดอักเสบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เทียบระดับประเทศ
(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)


สถานการณ์โรคปอดอักเสบ

(ข้อมูลจาก รง.๕๐๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา)

นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Pneumonia ๕ ปี จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๐.๒๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๑๙๖ ราย เพศหญิง ๑๓๔ ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑.๔๖ : ๑

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐-๔ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๘๒.๑๙ รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป, ๕-๙, ๕๕-๕๙, ๕๐-๕๔, ๓๐-๓๔, ๔๕-๔๙, ๔๐-๔๔, ๓๕-๓๙, ๒๐-๒๔, ๒๕-๒๙, ๑๕-๑๙, ๑๐-๑๔ อัตราป่วยเท่ากับ ๘๘.๗๕, ๓๐.๖, ๓๐.๑๒, ๑๕.๐๘, ๑๔.๓๙, ๑๓.๙๒, ๑๓.๔๑, ๙.๓๑, ๕.๕๘, ๕.๓๓, ๔.๒๒ และ ๔.๒ ตามลำดับ




รูปที่ ๑๒ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคปอดอักเสบจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔

เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า อัตราป่วยโรคปอดอักเสบต่ำกว่าค่ามัธยฐานในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยในเดือนมกราคม ๗๖ ราย กุมภาพันธ์ ๘๕ ราย มีนาคม ๑๑๒ ราย เมษายน ๕๗ ราย




รูปที่ ๑๓ จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจำแนกรายเดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๓ เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง



รูปที่ ๑๔ จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบ มัธยฐานรายสัปดาห์

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ ๑๕๗ ราย โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ ๒๙ ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ ๑๓๓ ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่ากับ ๑๑ ราย

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอบางปะหัน อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๒.๗๓ (๔๓ ราย) รองลงมาคือ บางไทร ๗๘.๘๙ (๓๘ ราย), นครหลวง ๕๔.๓๙ (๒๐ ราย), ผักไห้ ๕๑.๘๖ (๒๑ ราย), มหาสาร ๔๗.๑๙ (๑๑ ราย), พระนครศรีอยุธยา ๔๓.๙๗ (๖๒ ราย), อุทัย ๔๓.๖๗ (๒๓ ราย), บางปะอิน ๓๗.๐๔ (๔๒ ราย), บางซ้าย ๓๖.๒ (๗ ราย), บางบาล ๓๕.๑ (๑๒ ราย), ท่าเรือ ๓๒.๑ (๑๕ ราย), เสนา ๒๒.๕๖ (๑๕ ราย), ว่างน้อย ๑๙.๗๗ (๑๕ ราย), ลาดบัวหลวง ๑๒.๖ (๕ ราย), ภาชี ๓.๒๑ (๑ ราย) และ บ้านแพรก ๐ (๐ ราย) ตามลำดับ




รูปที่ ๑๕ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคปอดอักเสบ จำแนกรายอำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๖๔ เทียบค่ามัธยฐานอัตราป่วย ๕ ปี ย้อนหลัง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ตารางที่ ๕ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔

(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับเขต ๔ (อัตราป่วย)	ลำดับประเทศ (อัตราป่วย)	จังหวัด	รวมป่วย (ราย)	อัตราป่วยต่อแสน	รวมตาย (ราย)	อัตรารายต่อแสน
๑	๑๓	นนทบุรี	๗๘	๖.๒๑	๐	๐.๐๐
๒	๑๘	สระบุรี	๒๙	๔.๔๙	๐	๐.๐๐
๓	๒๓	พระนครศรีอยุธยา	๒๘	๓.๔๑	๐	๐.๐๐
๔	๓๐	ปทุมธานี	๓๒	๒.๗๗	๐	๐.๐๐
๕	๓๕	ลพบุรี	๑๙	๒.๕๑	๐	๐.๐๐
๖	๔๙	นครนายก	๓	๑.๑๕	๐	๐.๐๐
๗	๕๙	อ่างทอง	๒	๐.๗๑	๐	๐.๐๐
๘	๗๓	สิงห์บุรี	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
		รวมเขต ๔	๑๙๑	๓.๔๒	๐	๐.๐๐
		รวมทั้งประเทศ	๒,๕๑๙	๓.๗๙	๒	๐.๐๐



รูปที่ ๑๖ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เทียบระดับประเทศ (ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

(ข้อมูลจาก รง.๕๐๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา)

นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกรวม(๒๖,๒๗,๖๖) จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๔๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๒๐ ราย เพศหญิง ๘ ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง เท่ากับ ๒.๕๐ : ๑

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๕-๙ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๑๐.๗๑ รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔, ๑๕-๑๙, ๒๐-๒๔, ๐-๔, ๕๕-๕๙, ๔๐-๔๔, ๒๕-๒๙, ๓๐-๓๔, ๕๐-๕๔, ๓๕-๓๙, ๖๐ ขึ้นไป, ๔๕-๔๙ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐.๔๖, ๖.๓, ๕.๔, ๔.๗, ๓.๖, ๓.๐๓, ๑.๘๒, ๑.๗๓, ๑.๕๔, ๑.๕, ๑.๔๒ และ ๐ ตามลำดับ




รูปที่ ๑๗ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔

เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่ำกว่าค่ามัธยฐานในช่วงระยะเวลาพบผู้ป่วยเดือนมกราคม ๑๑ ราย กุมภาพันธ์ ๕ ราย มีนาคม ๘ ราย เมษายน ๔ ราย ดังรูป




รูปที่ ๑๘ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายเดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบ ค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง



รูปที่ ๑๙ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบ มัธยฐานรายสัปดาห์

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอท่าเรือ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐.๗ (๕ ราย) รองลงมาคือ มหาราช ๘.๕๘ (๒ ราย), บางบาล ๕.๘๕ (๒ ราย), ผักไห่ ๔.๙๔ (๒ ราย), บางปะหัน ๔.๗๘ (๒ ราย), พระนครศรีอยุธยา ๔.๒๖ (๖ ราย), วังน้อย ๓.๙๕ (๓ ราย), ภาชี ๓.๒๑ (๑ ราย), เสนา ๓.๐๑ (๒ ราย), นครหลวง ๒.๗๒ (๑ ราย), บางปะอิน ๑.๗๖ (๒ ราย), บางไทร ๐ (๐ ราย), ลาดบัวหลวง ๐ (๐ ราย), บางซ้าย ๐ (๐ ราย) และ อุทัย ๐ (๐ ราย) ตามลำดับ



รูปที่ ๒๐ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๖๔ เทียบค่ามัธยฐานอัตราป่วย ๕ ปี ย้อนหลัง

ข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รง.๕๐๖)

กระจายอยู่ใน ๑๑ อำเภอ ดังนี้ อ.พระนครศรีอยุธยา ๖ หมู่ , อ.ท่าเรือ ๔ หมู่ , อ.นครหลวง ๑ หมู่ , อ.บางบาล ๒ หมู่ , อ.บางปะอิน ๑ หมู่ , อ.บางปะหัน ๒ หมู่ , อ.ผักไห่ ๒ หมู่ , อ.ภาชี ๑ หมู่ , อ.วังน้อย ๓ หมู่ , อ.เสนา ๒ หมู่ , อ.มหาราช ๒ หมู่ ,

ตารางที่ ๖ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมในสัปดาห์ระบาด (ตามวันเริ่มป่วย)

อำเภอ	ตำบล	หมู่ ที่	สัปดาห์ระบาด						
			๐-๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๓-๑๖	๐-๑๖
ท่าเรือ	จำปา	๐๙	๑					๐	๑
ท่าเรือ	ท่าเรือ	๐๑	๑					๐	๑
ท่าเรือ	ท่าหลวง	๐๑	๐			๒		๒	๒
ท่าเรือ	ท่าหลวง	๐๓	๑					๐	๑
นครหลวง	แม่ลา	๐๖	๑					๐	๑
บางบาล	ไทรน้อย	๐๖	๑					๐	๑
บางบาล	มหาพรหมณ์	๐๔	๑					๐	๑
บางปะหัน	ขวัญเมือง	๐๕	๑					๐	๑
บางปะหัน	โพธิ์สามต้น	๐๖	๑					๐	๑
บางปะอิน	บ้านสร้าง	๐๕	๒					๐	๒
ผักไห่	ศาลาน	๐๑	๑					๐	๑
ผักไห่	หนองน้ำใหญ่	๐๓	๐	๑				๑	๑
พระนครศรีอยุธยา	คลองสวนพลู	๐๗	๑					๐	๑
พระนครศรีอยุธยา	ปากกราน	๐๒	๑					๐	๑
พระนครศรีอยุธยา	ปากกราน	๐๓	๑					๐	๑
พระนครศรีอยุธยา	ไผ่ลิง	๐๕	๑					๐	๑
พระนครศรีอยุธยา	ไผ่ลิง	๐๖	๑					๐	๑
พระนครศรีอยุธยา	หอรรัตนไชย	๐๔	๐		๑			๑	๑
ภาชี	ระโสม	๐๓	๑					๐	๑
มหาราช	ท่าตอ	๙๙	๑					๐	๑
มหาราช	หัวไผ่	๐๕	๑					๐	๑
วังน้อย	พยอม	๐๕	๑					๐	๑
วังน้อย	ลำตาเสา	๐๗	๑					๐	๑
วังน้อย	ลำไทร	๐๔	๑					๐	๑
เสนา	บางนมโค	๐๕	๑					๐	๑
เสนา	บ้านโพธิ์	๐๗	๐				๑	๑	๑
ผลรวมทั้งหมด			๒๓	๑	๑	๒	๑	๕	๒๘

ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาในภาพรวมของระดับพื้นที่ ควรมีการดำเนินการทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอ และจังหวัด ให้ลำดับความสำคัญของปัญหาและประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถวางแผน กำหนดมาตรการ และการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

การป้องกันโรคลวงหน้า โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในบ้านและรอบบ้านช่วงเวลาสำคัญที่ควรดำเนินการคือช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปีเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่โอกาสการแพร่โรคเกิดน้อยที่สุด และจะส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจเกิดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) โดยทุกพื้นที่ควรเน้นดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการระบาด โดยการให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยทุกราย แม้ว่าเป็นรายที่สงสัย หรือเกิดโรคนอกช่วงฤดูกาลระบาด โดยต้องดำเนินการควบคุมลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยพร้อมกัน และติดตามสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของทีม JIT-SAT ในระดับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงสูงสถานบริการที่พบผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออก ขอให้รับแจ้งรายงานให้กับทีม JIT-SAT (กรณีอำเภอเดียวกัน)และให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากพบผู้ป่วย เพื่อเร่งรัดดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน การควบคุมโรคในพื้นที่ให้รับดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งและให้กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยบริเวณบ้านผู้ป่วย และค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน



ทีม JIT-SAT เมื่อทำการสอบสวนโรคแล้วหากพบว่าผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยรายอื่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้รับแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบเพื่อประสานงานในลำดับต่อไป

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

ตารางที่ ๗ สถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๔

(ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับ เขต ๔ (อัตราป่วย)	ลำดับ ประเทศ (อัตราป่วย)	จังหวัด	รวมป่วย (ราย)	อัตราป่วย ต่อแสน	รวมตาย (ราย)	อัตราตาย ต่อแสน
๑	๕๕	สระบุรี	๓๙	๖.๐๔	๐	๐.๐๐
๒	๕๗	อ่างทอง	๑๕	๕.๓๕	๐	๐.๐๐
๓	๖๓	ลพบุรี	๒๘	๓.๗๐	๐	๐.๐๐
๔	๖๗	พระนครศรีอยุธยา	๒๕	๓.๐๕	๐	๐.๐๐
๕	๖๙	นครนายก	๗	๒.๖๙	๐	๐.๐๐
๖	๗๐	นนทบุรี	๓๒	๒.๕๕	๐	๐.๐๐
๗	๗๓	สิงห์บุรี	๕	๒.๓๙	๐	๐.๐๐
๘	๗๖	ปทุมธานี	๙	๐.๗๘	๐	๐.๐๐
		รวมเขต ๔	๑๖๐	๒.๙๗	๐	๐.๐๐
		รวมทั้งประเทศ	๑๓,๙๐๕	๒๐.๙๑	๐	๐.๐๐



รูปที่ ๒๑ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือเท้าปากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เทียบระดับประเทศ (ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)


สถานการณ์โรคมือเท้าปาก (จาก รง.๕๐๖ สสจ.พระนครศรีอยุธยา)

นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Hand,foot and mouth disease จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๓๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต


พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๒๒ ราย เพศหญิง ๑๔ ราย อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิง เท่ากับ ๑.๕๗ : ๑

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี คิดเป็นอัตราป่วย ๖๖.๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี, ๑๐ - ๑๔ ปีอัตราป่วยเท่ากับ ๑๗.๔๘,๒.๑ ต่อแสนประชากร

เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า อัตราป่วยโรคมือเท้าปากต่ำกว่ามัธยฐาน พบผู้ป่วยในเดือน มกราคม ๕ ราย กุมภาพันธ์ ๔ ราย มีนาคม ๑๗ ราย เมษายน ๑๐ ราย ดังรูป




รูปที่ ๒๒ จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจำแนกรายเดือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง



รูปที่ ๒๓ จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบมัธยฐานรายสัปดาห์

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ ๑๗ ราย โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ ๓ ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ ๑๕ ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เท่ากับ ๑ ราย

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภออุทัย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓.๒๙ (๗ ราย) รองลงมาคือ พระนครศรีอยุธยา ๗.๘ (๑๑ ราย), วังน้อย ๕.๒๗ (๔ ราย), บางซ้าย ๕.๑๗ (๑ ราย), บางปะหัน ๔.๗๘ (๒ ราย), เสนา ๔.๕๑ (๓ ราย), บางปะอิน ๔.๔๑ (๕ ราย), บางบาล ๒.๙๒ (๑ ราย), ลาดบัวหลวง ๒.๕๒ (๑ ราย), บางไทร ๒.๐๘ (๑ ราย), ท่าเรือ ๐ (๐ ราย), นครหลวง ๐ (๐ ราย), ผักไห่ ๐ (๐ ราย), ภาชี ๐ (๐ ราย), มหาสาร ๐ (๐ ราย) และ บ้านแพรก ๐ (๐ ราย) ตามลำดับ



รูปที่ ๒๔ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือเท้าปากจำแนกรายอำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๖๔
เทียบค่ามัธยฐานอัตราป่วย ๕ ปี ย้อนหลัง

ข้อเสนอแนะ

สำหรับโรคมือเท้าปากขณะนี้พบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ควรกำชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ควรประสานครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อร่วมเฝ้าระวังและตรวจจับโรคได้ทันและแจกเอกสารความรู้โรคมือเท้าปาก ให้ผู้ปกครองเด็กทุกคน รวมทั้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องเล่น ของใช้ของเด็กทุกวัน และให้ช่วยตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ดูตุ่มที่มือ เท้า และปากของเด็ก หรือมีไข้ หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กและให้ผู้ปกครองรับตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทันที และพื้นที่ที่มีผู้ป่วยใน ๑ - ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาควรเพิ่มมาตรการ ดังนี้

๑. อำเภอควรแจ้งเตือนเครือข่าย JIT/SAT ตำบล ให้เฝ้าระวัง ป้องกันและ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นประจำ

๒. ขอให้โรงพยาบาล และ รพสต. ทุกแห่ง เฝ้าระวังเป็นพิเศษในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ที่มารับการรักษา

๓. หากเข้าข่ายสงสัยให้รีบแจ้งทีม JIT/SAT ระดับอำเภอและตำบล สอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ โดยเร็วและรพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งให้ อาสาสมัครสาธารณสุข เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กชั้นอนุบาล

๔. ให้ประสานครูในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือหากมีเด็กป่วยและมีการปิดชั้นเรียน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งให้อำเภอรายงานจังหวัดทราบทันที